

MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES
INFRASTRUCTURES

AGENCE NATIONALE DE LA
MÉTÉOROLOGIE

Email : maligtpa@gmail.com



REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE –UN BUT –UNE FOI



Bulletin Décadaire d'Information Agro-Hydro-Météorologique

GRUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE D'ASSISTANCE AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE (GTPA)
CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATIQUES DU MALI (CNSC-MALI)

Bulletin N°13 :

Décade du 1^{er} au 10 septembre 2025

Contenu du Bulletin

- Situation météorologique
- Situation des catastrophes
- Situation hydrologique
- Situation agricole
- Situation du Criquet Pèlerin
- Situation pastorale
- Situation zoosanitaire
- Situation de la Flore et de la Faune
- Situation halieutique
- Perspectives
- Avis et Conseils




I. Situation météorologique

1.1 Pluviométrie


Au cours de la décade, les pluies ont été bien réparties dans le temps et dans l'espace, avec une fréquence moyenne de cinq (05) jours de pluie. Les cumuls pluviométriques décennaux les plus élevés ont été enregistrés dans les stations de Selingué (146 mm), Yélimané (124 mm), Ouéléssébougou (117 mm), Kolokani (112 mm), Tominian (110 mm) et Bankass (108 mm) (cf. **carte n°1**). Ces quantités très importantes enregistrées ont entraîné un ruissellement excédant 100 mm dans plusieurs localités (cf. **tableau n°1**), soit l'équivalent de plus de 1 000 m³ d'eau par hectare. Ces volumes élevés de ruissellement sont susceptibles d'accroître de manière significative le risque d'inondations localisées. De tels événements hydrométéorologiques peuvent entraîner des conséquences majeures, notamment :

- Sur le plan agricole : destruction des cultures ;
- Sur le plan pastoral : diminution des pâturages, difficultés d'accès à l'eau pour le bétail, mortalité animale ;
- Sur le plan socio-économique : pertes de biens et d'infrastructures, perturbation des activités économiques, déplacements de populations ;
- Sur le plan sanitaire : prolifération de maladies hydriques et vectorielles, dégradation des conditions d'hygiène et de santé ;
- Sur le plan environnemental : inondations, érosion des sols, déforestation accrue et perte de biodiversité.

Globalement, les quantités de pluies enregistrées durant cette décade ont été excédentaires à normales. Toutefois, des quantités déficitaires ont été observées dans les régions de Sikasso, Kidal, Dioïla, Gao ainsi que les localités de Kénieba, Diéma, Nara, Bougouni, Yanfolila, Ségou, San, Djenné, Koro et le District de Bamako (cf. **carte n°2**).




Carte n°2 : Pluies recueillies pendant la décade du 1^{er} au 10 septembre 2025 par rapport à la moyenne (1991-)




Carte n°3 : Pluies recueillies pendant la décade du 1^{er} au 10 septembre 2025 par rapport à l'année 2024

Cette décade comparée à la même décade de l'année 2024, les quantités de pluies recueillies ont été inférieures, excepté dans les régions de Nioro, Kita, Dioïla, le Nord de la région Bougouni, le Centre des régions de Koulikoro et Ségou ainsi que les localités de Tominian, Mopti et Douentza, où elles ont été supérieures à égales (cf. **carte n°3**).

Du 1^{er} mai au 10 septembre 2025, le cumul pluviométrique reste normal à excédentaire dans l'ensemble par rapport à la normale climatologique, hormis dans les localités de Gao et Bourem, où il a été inférieur (cf. carte n°4).



Carte n°5 : Cumul des pluies du 1^{er} mai au 1^{er} septembre 2025 par rapport à l'année 2024




Carte n°4 : Cumul des pluies du 1^{er} mai au 10 septembre 2025 par rapport à la moyenne (1991-)

Ce cumul de 2025, comparé à celui de 2024 à la même période, a été supérieur à égal en général, sauf dans les régions de Gao, Taoudéni et dans les localités de Kénieba, Banamba, Kolondieba, Kadiolo, Ségou, San, Bla, Bandiagara et Ménaka, où il a été inférieur (cf. carte n°5).

1.2 Suivi hydrique

• *Evaporation de l'eau et transpiration au niveau des sols et de l'environnement (ETP)*


Au cours de cette décade, l'évapotranspiration potentielle (ETP) a varié en moyenne entre 20 et 40 mm dans la plupart des régions, hormis celles de Kidal, Taoudéni et le Nord de celle de Gao, où elle est restée inférieure à 10 mm. Les valeurs les plus élevées ont été enregistrées à Niono (47 mm), Nara (37 mm), San et Ségou (31 mm), Kita (30 mm), Nioro (28 mm), comparativement à celle de la décade passée, nous constatons une légère augmentation de l'ETP traduisant une forte demande évaporative dans ces localités (cf. carte n° 6).



Carte n°6 : Evapotranspiration de la première décade de septembre 2025

• *Bilan hydrique*


Au cours de la décade, les pluies enregistrées ont globalement dépassé la demande évaporative du climat, traduisant un bilan hydrique climatique positif dans la majeure partie du pays. Toutefois, dans certaines localités telles que Kita, Kolokani, Banamba, Yanfolila, Ménaka, l'évapotranspiration potentielle a excédé les apports pluviométriques, indiquant un déficit hydrique localisé et même important à Nara, Niono, Kidal et Gao (cf. carte n°7).



Carte n°7 : Bilan hydrique climatique de la première décade de septembre 2025

1.3 Le taux de satisfaction des besoins en eau des cultures (TSBE)

Au cours de cette décade, les besoins en eau des principales cultures (mil, sorgho, maïs et coton) ont été globalement satisfaits dans les localités de Nioro, Kita, Bamako, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Kénieba et San. En revanche, dans certaines zones, notamment à Nara un déficit hydrique marqué (inférieur à 50 %) a été observé, limitant la satisfaction des besoins en eau des cultures. Cette situation requiert une vigilance accrue quant à l'évolution de l'humidité des sols et aux risques de stress hydrique (cf. Graphique 1).

Graphique 1 : Le taux de satisfaction des besoins en eau décadaire du mil, sorgho, maïs et coton

Source, MALI-METEO 2025

Tableau 1 : Tableau pluviométrique au 10 septembre 2025.

N°	STATIONS	PLUIES JOURNALIERES										PLUIES DECADEAIRES				RUISELLEMENTS				CUMULS A PARTIR DU 1er MAI				POURCENTAGES			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PD25	NJD25	PD24	ND	DECADEAIRES	PC25	NJPC25	PC24	CN	PD25/ND	PC25/CN	PC25/PC24	PD25/PD24			
1	KAYES	20,7			34,3	5,5	6,3	5,7	0,1		2,5	75,1	7	143,9	63,2	45,1	532,4	53	532,2	522,3	119	102	100	52			
2	NIORO DU SAHEL	3,5			26,9	1,9	4,9	2,2	15,1		26,8	81,3	7	55,5	47,5	51,3	601,7	47	507,4	428,3	171	140	119	146			
3	YELIMANE	8,1			22	42,7	20,1	2,5	0,4		27,7	123,5	7	184,3	38,4	93,5	701,3	45	551,5	399,5	322	176	127	67			
4	DIEMA				8		27		2,3			37,3	3	3,7	51,9	7,3	450,9	39	332,2	458,9	72	98	136	1008			
5	MAHINA				43			2,6		16,2		61,8	3	170,3	80,9	31,8	727,2	59	797,9	646,6	76	112	91	36			
6	BAFOULABE				46			11		17		74	3	138	65	44	744,2	39	770,2	555,2	114	134	97	54			
7	KITA			1,7	28,9	7	8,3		21	8,3		75,2	6	35,1	90,4	45,2	1004,3	61	905,2	748,5	83	134	111	214			
8	KENIEBA				39,1			14,4	4,4	0,1	0,1	58,1	5	82	123	28,1	947	78	1276,6	919,6	47	103	74	71			
9	KOULIKORO					30	13	2,6		6		51,6	4	28,5	79,6	21,6	806,1	43	791,5	789,6	65	102	102	181			
10	BAMAKO VILLE			28	10,3	0,3			13,9	23	1,4	76,9	6	29,1	89	46,9	939,1	76	1144,8	793,7	86	118	82	264			
11	BAMAKO SENOUI	0,5		29	12	1,8		0,3	1,4	14,7	0,5	60,2	8	20,9	82,5	30,2	782,7	65	975,7	774,5	73	101	80	288			
12	SOTUBA	2,4		40	18,7	0,3		0,2	1,4	28,3	1,4	92,6	8	11,2	79,4	62,6	881,7	70	922,6	731	117	121	96	827			
13	KATIBOUGOU				33,6	1,7			2	2,2	0,3	39,8	5	21,3	78,1	9,8	827,1	72	763,6	735,8	51	112	108	187			
14	KATI-HAUT	24		8	20			2,5	6,5	12	-999	73	6	60	75,4	43	868,5	52	1227	704,2	97	123	71	122			
15	BAGUINEDA				22	25	1		6			54	4	9	68,9	24	783	45	929	680,8	78	115	84	600			
16	OUELESSEBOUGOU		49	4,1	10,2		1,8		37,2	1,4	13,5	117,2	7	15	92,3	87,2	926,6	54	886,2	853,5	127	109	105	781			
17	SELINGUE		9,8	37,4	49,1	0,5			42,8		6,3	145,9	6	42,6	90,4	115,9	762,4	58	656	863,1	161	88	116	342			
18	DIOILA		6,5		6,7	9,4			15,2	5,5		43,3	5	18,1	58,8	13,3	657,6	48	752,3	697,4	74	94	87	239			
19	BANKOUMANA				48					33		81	2	48,7	80,9	51	1054	41	902,7	782,9	100	135	117	166			
20	KOLOKANI				35			21	24	32		112	4	65	63,8	82	836,5	39	785,3	673,9	176	124	107	172			
21	DIDIENI				12,7			4		29,2		45,9	3	57,4	54,7	15,9	741,2	43	771,7	555,8	84	133	96	80			
22	NARA	1,3	1,2		6,1	0,4			8,5	3,8		21,3	6	97	38,2	0	406,1	43	433,7	364	56	112	94	22			
23	BANAMBA		32		44				10			86	3	121	55,7	56	489,9	29	961,5	607,4	154	81	51	71			
24	KANGABA				57,4				10,2	19,4	1,5	88,5	4	39,1	88,7	58,5	812,8	54	950,3	825,7	100	98	86	226			
25	SIKASSO			22,1			0,3	1,1	3,4	4,1		31	5	203,2	96,5	1	832,2	74	1009,1	905,8	32	92	82	15			
26	BOUGOUNI		4	5,2		7,6				3,1	2,7	22,6	5	51,7	78,5	0	805,4	65	1021,3	898,6	29	90	79	44			
27	YANFOLILA			23		16,2		8,3	1,8	1	24,1	74,4	6	55,6	88,2	44,4	947,8	66	872,8	912,2	84	104	109	134			
28	KOUTIALA			15	0,1	12,4		4,6	0,3	8,9		41,3	6	86	70,5	11,3	915,1	59	854,3	728,6	59	126	107	48			
29	N'TARLA IRCT			17		26		5		8		56	4	68,3	78,8	26	893,9	47	778,3	705,6	71	127	115	82			
30	KADIOLO	0,2	2,5	21,7			6,7	3,5	3,9	0,2	3,5	42,2	8	209,4	82,7	12,2	696,9	69	1089,8	861	51	81	64	20			
31	KOLONDIÉBA		20	50		4	5				10,5	89,5	5	115,3	91,5	59,5	753,3	56	1119,6	928,8	98	81	67	78			
32	YOROSSO			1,4	2,7	19,5		1,8		33,8		59,2	5	80,4	57,3	29,2	802,2	53	776,8	624	103	129	103	74			
33	SEGOU	10,3			46	13,2	0,1	7,5		6,6	0,9	84,6	7	32,9	54	54,6	647	60	948,2	571,5	157	113	68	257			
34	SAN				14,8	3,7		16	2,4	10,6		47,5	5	86,5	66,9	17,5	569,6	49	881,5	612,1	71	93	65	55			
35	KONOBOUGOU				20	10						30	2	45	59,6	0	716,5	40	948,5	585,9	50	122	76	67			
36	KE-MACINA	1,6	1,2		17,2	1,2	16	4,9		7,3		49,4	7	63,3	47,4	19,4	505,6	54	706,4	504	104	100	72	78			
37	BAROUELI		5,1	14,2	17,2	28,6					6,1	0,4	71,6	6	19,6	53,9	41,6	719,4	51	688,7	635,6	133	113	104	365		
38	BLA				30	10		15	4	4		63	5	45	56,7	33	643	37	813	663,8	111	97	79	140			
39	NIONO		11,1		27	9,6	9,6	11,4	1,1	28,1		97,9	7	44,3	44,4	67,9	479,2	39	509,7	415,8	220	115	94	221			
40	TOMINIAN	8	3		24	1		38		36		110	6	63	58,5	80	739,5	35	709	573,4	188	129	104	175			
41	MOPTI		16,4		9,5	7,6	2		0,2	1,2		36,9	6	27,5	39,8	6,9	570,1	44	536,1	438,6	93	130	106	134			
43	BANDIAGARA		30	15	23	4				14		86	5	64,2	51,5	56	474,5	31	628,3	500,3	167	95	76	134			
44	BANKASS	1,7	12	75	5,9	4,5				8,6		107,7	6	92,4	52,7	77,7	565,7	42	572	534,5	204	106	99	117			
45	DJENNE			21	31		7,3		8			67,3	4	131,8	50,5	37,3	591,2	34	785,5	482,4	133	123	75	51			
46	KORO	3,8		18,4	6,5	2,1						30,8	4	92,3	50,8	0,8	566,4	42	455,5	495	61	114	124	33			
47	TENENKOU	11		3	11	2				5		32	5	161,5	44,9	2	479	30	799,5	443,4	71	108	60	20			
48	DOUENTZA			22	5				35			62	3	56	33,6	32	585,5	30	481	378,1	185	155	122	111			
49	GAO				2	7				9		18	3	42	20,3	0	126	15	495	219,9	89	57	25	43			
50	MENAKA					17				6		23	2	92	20,4	0	217,5	14	407	208,3	113	104	53	25			
51	ANSONGO	5							7			12	2	38	22,5	0	246,1	19	334	276,4	53	89	74	32			
52	BOUREM											0	0	158	19,7	0	84	12	286	209	0	40	29	0			
53	TOMBOUCTOU	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	28	13,6	-999	-999	-999	189	177,8	-999	-999	-999	-999			
54	GOURMA-RHAROUS	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	66	14,2	-999	-999	-999	365	209,8	-999	-999	-999	-999			
55	GOUNDAM	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	42	17,7	-999	-999	-999	216	179,3	-999	-999	-999	-999			
56	DIRE	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	71	17,4	-999	-999	-999	216	203,9	-999	-999	-999	-999			
57	KIDAL											0	0	29	13,7	0	157	11	112	136,5	0	115	140	0			
58	TESSALIT						4					4	1	14	9,9	0	67	8	134	88	40	76	50	29			

PD: Pluies décadaires
ND: Normale décadaire
NJD: Nbre de jours de pluie de la décade

X25 et X24: paramètres des années 2025 et 2024
PC: pluie cumulée
NJPC: nbre de jours de pluie cumulés

RS: Ruissellement
CN: cumul Normal
(-999): données manquantes

Source, MALI-METEO 2025

II. Situation hydrologique

La situation hydrologique de la décade a été caractérisée par la baisse de niveau sur tous les cours d'eau, à l'exception de la confluence du Bani/Niger à Mopti, du Niger moyen à Diré et Ansongo, du Bani à Douna, du Baoulé à Bougouni, du Bafing à Daka-Saidou et Manantali-Amont. Le remplissage des eaux des retenues de Sélingué et de Manantali se poursuit. Par contre les lâchers se poursuivent à Sélingué-Amont.

Les hauteurs moyennes décadaires sont inférieures à celles de l'année dernière pour la même période sur tous les cours d'eau, à l'exception du Sankarani à Sélingué-Amont, du Bafing à Daka-Saidou, Bafing Makana et Manantali-Amont. Elles sont supérieures à celles d'une année moyenne pour la même période sur tous les cours d'eau, à l'exception du Niger à Koulikoro et Kirango, du Bani à Douna, du Sénégal à Kayes et du Bakoye à Oualia.

Tableau 2 : Situation hydrologique de la décade du 1^{er} au 10 septembre 2025

N°	Stations	cours d'eau	Hauteurs moyennes décadaires (cm)							Débits (m³/s)	Observations
			(cm)	Année	Année	Décade	(cm)	(cm)	(cm)		
							Ecart	Ecart	Ecart		
			Moy	2024	2025	Précédente	a 025-déc préc	a 025-a 024	a 025-Moy		
1	Banankoro	Niger	535	752	577	604	-27	-175	42	+	
2	Bamako	Niger	314	383	319	340	-21	-64	5	+	
3	Koulikoro	Niger	536	558	452	485	-33	-106	-84	+	
4	Kirango	Niger	519	540	491	505	-14	-49	-28	+	
5	Mopti	Bani/Niger	570	640	604	564	40	-36	34	+	
6	Diré	Niger	385	445	424	384	40	-21	39	+	
7	Gao	Niger	267	+	+	+	+	+	+	+	
8	Ansongo	Niger	210	250	236	225	11	-14	26	+	
9	Douna	Bani	671	742	655	627	28	-87	-16	+	
10	Koryoumé	Niger	+	+	+	+	+	+	+	+	
11	Dioila	Baoulé	+	648	543	572	-29	-105	+	+	
12	Bougouni	Baoulé	610	854	636	443	193	-218	26	+	
13	Sélingué-Amont	Sankarani	+	34565	34616	34647	-31	51	+	+	Cm IGN
14	Kayes	Sénégal	651	572	530	615	-85	-42	-121	+	
15	Oualia	Bakoye	483	501	479	548	-69	-22	-4	+	
16	Gourbassy	Falémé	419	530	523	593	-70	-7	104	+	
17	Daka-Saidou	Bafing	412	381	475	445	30	94	63	+	
18	Bafing Makana	Bafing	+	740	770	804	-34	30	+	+	
19	Manantali-Amont	Bafing	+	20114	20589	20361	228	475	+	+	Cm IGN
20	Pankourou	Bagoé	732	1139	+	705	+	+	+	+	

+ données manquantes

sec : cours d'eau sec

Source, DNH 2025

III. Situation de catastrophes

Pas des cas de catastrophes signalés au cours de la décade.

IV. Situation agricole

♣ Activités agricoles

Les principales activités agricoles sont dominées par :

- la poursuite des opérations d'entretien des cultures notamment : le sarclo-binage, le buttage, l'apport de la fumure minérale et le traitement phytosanitaire ;
- le placement des carrés de rendement ;
- les opérations de récolte pour les premiers semis d'arachide et de maïs frais dans certains bassins de production agricole ;
- la poursuite des opérations de repiquage du riz dans les rizières au niveau des périmètres irrigués et dans les régions du Nord ;
- la poursuite de la distribution des engrais PDZAM, PUPSAN ;
- l'évaluation des superficies perdues par l'inondation.

♣ Evolution des emblavures

Les opérations de semis ont bien évolué avec les quantités de pluie enregistrées au cours de la décade.

Tableau 3 : Synthèse des semis à la date du 10 septembre 2025

Désignation	Toutes cultures confondues	Toutes Céréales confondues	Céréales sèches	Riz	Coton	Légumineuses	Cultures maraichères
Réalisations 2025 (ha)	8 192 264	6 256 049	5 489 898	766 151	622 599	1 158 911	154 705
Objectifs 2025 (ha)	8 644 942	6 592 065	5 705 129	886 936	672 000	1 214 487	166 389
Taux de réalisation 2025 %	95	95	96	86	93	95	93
Réalisations 2024 (ha)	8 196 556	6 270 064	5 455 296	814 768	697 367	1 182 629	46 496

Source : DNA/CMDT, Offices et Agences, 2025

A la date du 10 septembre 2025, les réalisations pour toutes les cultures confondues sont de 8 192 264 ha sur une prévision de 8 644 942 ha, soit 95% de réalisation. Elles sont légèrement inférieures à celles de la campagne dernière à la même période qui étaient de 8 196 556 ha.

Ces réalisations sont essentiellement dominées par les céréales sèches et les légumineuses, qui ont des taux de réalisation respectifs de 96% et 95%.

♣ Stades phénologiques des cultures

De façon générale, le stade phénologique des cultures se présente comme suit :

- Maïs : floraison-épiaison et la montaison pour les derniers semis ;
- Mil/Sorgho : montaison-épiaison et tallage pour les derniers semis ;
- Cotonnier : floraison et apparition des capsules ;
- Riz : levé, tallage, montaison et épiaison suivant les systèmes de culture ;
- Fonio : floraison pour les premiers semis et ramification pour les derniers semis ;
- Arachide : ramification, floraison et apparition des gousses ;
- Niébé : levée, ramification et début floraison.

V. Situation du Criquet Pèlerin

La situation du Criquet pèlerin est restée relativement calme sur toute l'étendue du territoire national.

VI. Situation phytosanitaire

La période de la 1^{ère} décade du mois de septembre 2025 a été relativement calme dans l'ensemble sur le plan phytosanitaire. En dépit de cet état phytosanitaire, des infestations sporadiques de la chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*) sur la culture de maïs et de sorgho, sauteriaux sur les céréales (mil et sorgho) et des jassides (*Amrasca biguttula*, *Jacobiella sp*, *Empoasca sp*) sur les cultures solanacées et le coton ont été observées. Les zones de productions agricoles les plus affectées sont dans les régions de Sikasso, Dioïla, Bougouni, Kita, Koutiala, Ségou, San et le sud de Kayes et de Koulikoro. Des dégâts d'autres nuisibles notamment les coléoptères, chenilles défoliatrices, mouche de fruits, maladies, adventices, oiseaux granivores et les rongeurs ont été observées sur les cultures céréalières, maraichères, légumineuses et fruitières.

Les dégâts observés sur les cultures se caractérisaient par le rabougrissement des plants, le déchiquetage des feuilles, la recroqueville des feuilles, la nécrose des feuilles, la chute des organes floraux et des fruits, etc. Ils ont été toutefois circonscrits grâce à la promptitude d'interventions phytosanitaires des producteurs sous la conduite et l'appui conseils des agents de l'OPV.

En résumé, les réalisations techniques ont porté sur 9 200 ha prospectés, sur lesquels 3 933 ha ont été jugés infester et 2 021 ha traités à l'aide des méthodes alternatives de lutte (Extrait de Neem, cendre, l'eau savonneuse ...), pesticides biologiques (RAPAX) beaucoup utilisés par les producteurs contre la chenille de maïs et des insecticides

de synthèse (anti-jassides, Décis 50 EC, Emamectine benzoate, Pyrical 480 EC, Chlorpyrifos-Ethyl, Lambda-cyhalothrine, Tallis 112 CE ...) pour sauvegarder les cultures et les récoltes.

Tableau 4 : Résultats de prospections, d'infestations et de traitements du 1^{er} au 10 septembre 2025

Nuisibles	Superficies prospectées (ha)	Superficies infestées (ha)	Superficies traitées (ha)
Criquet Arboricole	289	108	96
Sauteriaux	1 419	604	314
Coléoptères	813	566,7	256
Chenille Légionnaire d'Automne	2 028	676	511
Autres Chenilles	1 041	584	54
Mouche des Fruits	113	46,5	25,5
Jassides	853	414	313
Autres nuisibles	459	137	84
Maladies	1 324	305	23
Adventices	555	247	135
Oiseaux granivores	129	124	102
Rongeurs	177	121	107
Total	9 200	3 933	2 021

Source : OPV, 2025

VII. Situation pastorale

L'état des pâturages est bon dans l'ensemble du pays. Le tapis herbacé est bien fourni dans toutes les régions excepté les régions de Kidal, Ménaka, Taoudenni, Nara et Nioro où il est moins fourni.

Les conditions d'abreuvement sont satisfaisantes à la faveur des quantités de pluies recueillies. Les animaux s'abreuvent au niveau des eaux de surfaces, puits et forages pastoraux. L'état d'embonpoint des animaux est bon à passable dans l'ensemble du pays.

Les mouvements des animaux sont limités du fait de l'insécurité. Il est marqué par le regroupement des animaux dans les pâturages d'hivernage. Les troupeaux sédentaires sont sur les terroirs villageois et autour des centres urbains les plus sûrs dont certains sont sous la conduite des bergers et d'autres en divagation.

Tableau 5 : Synthèse des prix moyens du bétail sur les marchés en F CFA au cours de la décade

ESPECES	PRIX MINIMUM	PRIX MAXIMUM
BOVINS		
Bœufs	253 000	698 500
Taureaux	190 000	475 000
Vaches	185 000	390 000
T-Bouvillons	190 000	275 000
Génisses	160 000	275 000
OVINS		
Mâles adultes	30 000	215 000
Femelles adultes	22 500	170 000
Jeunes	17 500	75 000
CAPRINS		
Mâles adultes	25 000	90 000
Femelles adultes	20 000	75 000
Jeunes	12 500	65 000
AUTRES		
Equins	180 000	375 000
Asins	30 000	85 000
Poulet	1 350	5 000
Pintades	1 500	6 000
Pigeon (paire)	1 500	2 500
Canards	2750	5 000

Source DNPIA, 2025

Les prix des animaux sont en légère hausse sur les marchés à bétail par rapport à la décade précédente.

Tableau 6 : Synthèse des prix moyens régionaux de la viande par kilogramme sur les marchés en F CFA au cours de la décade

N°	Régions	Viande bovine				Viande ovine et caprine	
		Avec os		Sans os			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Kayes	2500	2700	3000	3300	2900	3000
2	Koulikoro	2400	3000	2800	3500	2500	3000
3	Sikasso	2500	3000	2700	3500	2900	3000
4	Ségou	2700	2800	3300	3500	3000	3100
5	Mopti	2500	2800	3000	3300	500*	-
6	Tombouctou	2500	2900	3000	3500	500*	-
7	Gao	2700	2900	3000	3200	500*	-
8	Kidal	2400	2600	3000	3300	500*	-
9	Taoudéni	2500	2600	3000	3200	500*	-
10	Ménaka	2500	2600	3000	3200	500*	-
11	Nioro	1750	3000	2000	4000	3000	3200
12	Bougouni	1750	3000	2700	3200	2500	3000
13	Dioïla	1750	2900	2300	3000	2500	3000
14	Koutiala	2000	2700	2500	3000	2500	3000
15	Kita	1800	2900	2400	3000	2500	3000
16	Nara	2500	3000	3000	3500	3000	3500
17	Bandiagara	2500	3000	3000	3500	3000	3200
18	San	2400	3000	2800	3500	2500	3000
19	Douentza	2900	3000	3000	3500	3800	4000
20	District de Bamako	3000	3500	3500	4000	3800	4500

Source DNPIA, 2025, 500 : 500 F le tas*

Le prix du kilogramme de la viande rouge varie de 1750 FCFA dans les localités de Simona, Boura, Kiffosso, Konséguela (région de Koutiala), les localités de Dioro, Fangasso, Sarro (région de Ségou), Keleya, Garalo (région de Bougouni) et à 4000 FCFA à Banconi Farada, Fadjiguila, Sokonafing, Banconi Plateau, Dabanani, Médine, Dibida, Djicoroni (District de Bamako) pour les bovins et de 2500 FCFA à 4000 FCFA pour les ovins/caprins dans le District de Bamako.

VIII. Situation Zoosanitaire

La période a été marquée par la vaccination des animaux contre les maladies réputées légalement contagieuses (la Péripleumonie Contagieuse Bovine, les maladies charbonneuses, les pasteurelloses, les maladies de la volaille, la Peste de Petits Ruminants etc.) et le suivi des cas de suspicion de maladies animales ainsi que les zoonoses.

Les réalisations de cette décade s'élèvent à 894 835 têtes toutes espèces confondues sur une prévision annuelle de 77 013 997 têtes soit un taux de 1,16%.

Les chiffres de vaccinations contre les principales maladies ciblées sont les suivants :

- 59 033 têtes de bovins contre la Péripleumonie Contagieuse Bovine (PPCB) ;
- 29 767 têtes d'ovins caprins contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) ;
- 223 099 sujets de volailles contre la maladie de Newcastle.

Une suspicion de rage (Ségou, commune de Macina, quartier de Missira) a été rapportée au cours de la période.

IX. Situation de la Flore et de la Faune

Elle a été marquée par des mutations morphologiques et/ou physiologiques (feuillaison, floraison, fructification) chez la majorité des essences forestières.

Le renouvellement du tapis herbacé se poursuit dans plusieurs localités du pays.

Il a été enregistré au niveau des postes forestiers 10 030 Qm (Quintal métrique) de charbon, 1700 stères et 28 tonnes de fourrages.

Au cours de la décade, le reboisement a concerné les principales espèces suivantes :

Balanites aegyptiaca (Zègènè), *Khaya senegalensis* (Djala), *Acacia senegal* (Gommier blanc), *Azadirachta indica* (neem), *Eucalyptus camaldulensis* (Mentilaton yirini), *Adansonia digitata* (Zirâ), *Parkia biglobosa* (Nèrè), *Moringa oleifera* (Mansa yiri), *Gmelina arborea* (Alimèti yirinin).

Le tableau ci-dessous donne le détail.

Tableau 7 : Situation du reboisement de la décade

Région	Superficie reboisée (ha)
Kayes	11
Koulikoro	7
Ségou	13
Sikasso	8
Mopti	2
Tombouctou	3
Kita	15
Bougouni	14
Nioro	9
San	7
Koutiala	6
Dioïla	5
Total	100

Source, DGEF 2025

Dans les aires protégées comme la réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé, l'état de l'habitat de la faune est bon dans l'ensemble et les cours d'eau sont approvisionnés.

Au total, 473 individus d'éléphants ont été dénombrés lors de l'étude et de comptage des éléphants de la Réserve de Biosphère du Gourma en 2025. Les mares sont approvisionnées et le tapis herbacé est bien fourni.

Quant au Parc Animalier de Tienfala, on dénombre de nos jours 86 individus toutes les espèces de faune confondues (girafe, buffles d'Afrique, zèbres et antilopes).

X. Situation halieutique

La situation halieutique de la décade a été caractérisée par une production de 2 248 tonnes relevées dans les différentes pêcheries contre 2 433 tonnes la décade passée soit une baisse de 7,59 %. Les principales espèces de poissons rencontrées dans les captures sont : *Oreochromis niloticus* (nteben), *Clarias anguilaris* (manogo), *Latesnilotica* (saalé), *Labeocoubie* (bamâfi), *Hydrocynus brevis* (wuludyege), *Mormyrus rume* (nana), *Auchenoglanis occidentalis* (korokoto)... Les prix moyens des différentes espèces de poissons d'eau douce relevés sur les principaux marchés régionaux sont restés stables dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Ségou, ont connu une légère augmentation à Mopti, une légère diminution à Gao, Sikasso et ordinairement plus élevés à Bamako.

Tableau 8 : Prix moyens indicatifs en FCFA /Kg de certaines espèces de poisson dans les principaux marchés régionaux et du District de Bamako.

Espèce	Kayes		Koulikoro		Sikasso		Ségou		Mopti		Tombouctou		Gao		Bamako	
	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP
Lates nilotica /capitaine (Frais)	3250	3250	2500	2500	3000	3000	2900	2900	1917	1917	2170	2170	2167	2167	4250	3970
Carpe/Tilapia (Frais)	2000	2000	2090	2090	2000	2000	1786	1786	1417	1417	1830	1830	783	867	2780	2820
Clarias (Fumé)	4000	4000	3000	3000	2750	3500	2094	2094	2233	2233	1750	1750	1667	2333	3750	3667
Hydrocynus/Poisson chien (séché)	6000	6000	3300	3300	1500	1500	2313	2313	3760	3580	1600	1600	2000	2333	7125	7125
Moyenne	3812,5	3813	2723	2723	2312,5	2500	2273	2273	2331,75	2287	1837,5	1838	1654,25	1925	4476,3	4396
Ecart (DA-DP)	0		0		-188		0		45		0		-271		81	

Source, DNP 2025

NB : DA=Décade Actuelle ; DP=Décade Précédente

Les prix de poissons de mer congelés importés relevés sur les principaux points de vente du District de Bamako, se présentent comme suit : Chinchard (*Trachurus*) 1400 FCFA /kg ; Machoiron (*Aruis sp*) 1210F CFA/kg ; Sardinelle (*Sardina PL chardus sp*) 1075 FCFA/kg ; Carpe (*Tilapia sp*) 2100 FA/kg...

- déclarer toute suspicion de maladies animales à caractère contagieux aux autorités administratives, techniques et politiques ;
- mettre les animaux en quarantaine en cas de suspicion de maladies et sous surveillance vétérinaire ;
- soumettre les animaux malades aux prélèvements d'organes par le vétérinaire pour raison de diagnostic de laboratoire (recherche de la nature de la maladie) ;
- se munir de certificat de vaccination pour les déplacements des troupeaux.

Bamako, le 15 septembre 2025
Le GTPA